

Protokoll

Sitzung vom 9. Dezember 1955

Anwesend: 20 Mitglieder und Gäste

Vorsitz: Herr Dr. W. Vogel

1. Mitgliederaufnahme: Herr A. Bischof, Zürich wird einstimmig als neues Mitglied aufgenommen.

2. Mitteilungen und Demonstrationen:

Die Reihe der interessanten Demonstrationen wird von den Lepidopterologen eröffnet.

Herr Heckendorn kann unter anderem eine seltene *Boarmia*-Art vorweisen.

Herr P. Weber berichtet wiederum von wichtigen Funden. *)

Um die Herkunft einer *Saturnia*-Zucht von Herrn Honegger entspinnt sich eine Diskussion.

Herr Eckardt kann eine reiche Sommerausbeute vorweisen.

Herr Meier beobachtete das Ueberhandnehmen der Sonderform *Argynnis valesina* über die Normalform *pavia* in Gobiotten mit Mischpopulationen.

Herr Dr. Allenspach erwähnt an Käferfunden: *Nobria cornicollis*, v. *heeri*, wurde im Hölloch gefangen. Diese hochalpine Form dürfte mit Schmelzwasser in die Tiefe gelangt sein. *Maltodes icaricus* ist neu für die Schweiz.

Nach einer Mitteilung von Dr. Wildbolz erzeugte die Weichwanze *Psallus ambiguus*, die bisher als ungefährlich galt, im Thurgau schwere Fruchtdeformationen an Glockenapfel.

Interessante Sammelergebnisse sollten im Protokoll festgehalten werden können. Der Vorsitzende regt deshalb an, dass dem Aktuar Autoreferate eingereicht werden.

*) Zusammenstellung der von Herrn P. Weber 1955 gefangenen und gezüchteten Falter.

Agrotis puta Hb. Mendrisio, 18.IX, 1 o am Licht.

A. praecox L. Mendrisio, 16. - 28.IX fast jeden Abend einige Stück a.L.

Hadona solieri B. Mendrisio, 23.IX, 1 o a.L.

Episema glaucina-hispana B. Mendrisio, 26.IX, 1 o a.L.

Hydrilla hospes Err. 13 ♂♂ durch Zucht erhalten. Eier von Ende Mai in Minusio bei Locarno a.L. gefangen ♀♀ (Sulzer-Steiner, Kilchberg). Raupen ab 12.VI., Futter: Löwenzahn; waren im Juli ausgewachsen, gingen in die Erde und verfertigten

einen Kokon. Von 200 Raupen verpuppten sich anfangs August 10 % und entwickelten sich vom 23.VIII - 9.IX zu Faltern; die restierenden 90 % überwintern als Raupe.

Micra purpurina Hb. Mendrisio, 18.19.IX, 2 ♂♂ 1 ♀ a.L.

Telesilla virgo Tr. Gordola, 2 ♀♀ in dem in einem Tabakfeld aufgestellten Lichtfangapparat, 2. Augushälfte.

Catocala puorpera Gio. Mendrisio, 22. IX, 1 ♂ a.L.

Simplicia rectalis Ev. Mendrisio, am 21. u. 24.IX 2 ♂♂ a.L.

Zanclognatha tarsiponnalis Tr. Mendrisio, 18.IX, 1 ♂ a.L.

Iemoria anella Schiff. Mendrisio, 1 ♂ am 18.IX a.L.

Cnephasia conspersana Dgl. Von dieser für die Schweiz neuen Art fing ich am 26.VI.54. 1 ♂ in Trevano bei Lugano a.L. Am 16. VI.55. erhielt ich durch Lichtfang am gleichen Ort ein zweites ♂.

Exepate congeatella Cl. Zürich, von den flugunfähigen ♀♀ mit reduzierten Flügeln klopfte Adonetz am 14.XI ca. 20 Stck. nachts an Liguster.

Crocidosoma plobojana Z. Mendrisio, 17.IX, 1 ♀ a.L., das zweite in der Schweiz festgestellte Exemplar.

Laspeyresia molesta Busk. Lugano, in Anzahl gezüchtet. Raupen in Triebspitzen von *Prunus Persica*; Falter 19.VI.- 3.VII. Unterscheidet sich von *funebrana* durch reichlichere und schärfere Zeichnung am Hinterrand der Vorderflügel und dem auffallend grauen Hinterflügelsaum bei den ♂♂.

Alabonia bractella L. 1 ♂ am 14. VII in Robasacco am Licht.

Xystophora hornigi Stgr. Rovello bei Lugano, 1 ♂ am 26.V. am Licht. Neu für die Schweiz.

Tischeria dodonaca Stt. 2 Falter erhalten aus Minen an Castanea von Ludiano am 1. VIII und 13. VIII; 1 ♀ daselbst am 11.VIII auch am Licht gefangen, also eine zweite Generation.

(Autoreferat)